

Φουσέκη Κρυσταλλία¹, Φωκά Ανθή¹, Μπαλάσης Σταύρος², Απάλλα Ζωή³, Γεωργίου Σοφία¹, Οικονόμου Χρύσα¹

¹Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ²Πλαστικός Χειρουργός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ³Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Οι όγκοι εξαρτημάτων του δέρματος, σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση του WHO (2025), αναλόγως της διαφοροποίησής τους, διακρίνονται σε αυτούς με εκκρινή, αποκρινή, θυλακική και σηπηματογόνο διαφοροποίηση. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των δερματοσκοπικών ευρημάτων σε ορισμένους από αυτούς τους όγκους

Σκοπός

Η καταγραφή δερματοσκοπικών ευρημάτων από τρεις περιπτώσεις όγκων εξαρτημάτων του δέρματος, με στόχο την αναγνώριση ειδικών δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών


Μέθοδοι

Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις ασθενών με όγκους εξαρτημάτων που αφαιρέθηκαν χειρουργικά και επιβεβαιώθηκαν ιστολογικά. Η καταγραφή έγινε μέσω δερματοσκοπικών εικόνων

Αποτελέσματα

Περιστατικό 1: Πιλοματρίκωμα

Ασθενής 65 ετών, άρρεν, εμφάνιζε από ενός μηνός ασυμπτωματική ερυθρή βλατίδα στον αριστερό βραχίονα. Ιστολογικά διαγνώστηκε πιλοματρίκωμα. Δερματοσκοπικά διακρίνεται ροζ χωρίς δομή φόντο με λευκές και κίτρινες περιοχές και μη εστιασμένα γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία.



Περιστατικό 2: Εκκρινές Πόρωμα

Ελκωτική πλάκα αριστερής παρειάς, σε θήλυ 79 ετών, ταυτοποιήθηκε ιστολογικά ως εκκρινές πόρωμα. Δερματοσκοπικά αναγνωρίζεται κεντρική διάβρωση σε ροζ χωρίς δομή φόντο και ακανόνιστα γραμμοειδή αγγεία.



Περιστατικό 3: Εκκρινές Ποροκαρκίνωμα

Ασθενής 88 ετών, άρρεν, παρουσίαζε από ετών ερυθρόφαιο οζίδιο δεξιού βραχίονα με εξέλκωση στην περιφέρεια. Ιστολογικά διαγνώστηκε εκκρινές ποροκαρκίνωμα. Δερματοσκοπικά χαρακτηρίζεται από διαβρώσεις, κίτρινα λέπια, καφέ-γκρι χωρίς δομή περιοχές, επιμήκη γραμμοειδή αγγεία αριστερά και δεξιά σπειραματοειδή αγγεία και ροζ σφαιρίδια.



Συμπέρασμα

Η συστηματική μελέτη και καταγραφή δερματοσκοπικών ευρημάτων σπάνιων δερματικών όγκων συντελεί στη διαμόρφωση ειδικών δερματοσκοπικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ακρίβεια της διάγνωσης και τη βελτιστοποίηση της κλινικής προσέγγισης και διαχείρισης αυτών των αλλοιώσεων.