

Θεραπευτική προσέγγιση του Lichen Aureus: Παρουσίαση περιστατικού eP01

Μαρία Μπακιρτζή¹, Χρήστος Πεντίδης², Ματθαίος Μπόμπος³, Φλωρεντίνα-Σύλβια Δελλή⁴

¹ Ιδιωτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη

² Ιδιωτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη

³ Μικροδιαγνωστική, Θεσσαλονίκη, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

⁴ Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη




Εισαγωγή:

Ο lichen aureus αποτελεί σπάνια μορφή πορφυρικής δερματίτιδας, με χρόνια και συχνά ανθεκτική πορεία. Η θεραπευτική του προσέγγιση παραμένει μη καθορισμένη, με ποικιλία τοπικών και συστηματικών επιλογών.

Μέθοδοι:

- Άνδρας 28 ετών
 - Βλάβη στη γαστροκνημία (Fig.3)
- Δερματοσκόπηση: Γκρίζες κουκίδες και ωοειδή, ερυθρά στοιχεία σε χάλκινο φόντο (Fig. 2)
- Ιστορικό: χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
 - Βιοψία: Lichen aureus (Fig.1)
 - Θεραπεία: τοπικά κορτικοστεροειδή κλάσης III + από του στόματος φλαβονοειδή



Αποτελέσματα:

- Βελτίωση >70% στην έκταση και ένταση της βλάβης
- Πλήρης υποχώρηση συμπτωμάτων

Συμπέρασμα:

Η παρούσα περίπτωση υποστηρίζει τη θεραπευτική αξία των φλαβονοειδών στη διαχείριση του lichen aureus, ιδιαίτερα σε ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.